

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ  
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ НАСТОЙКА

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Мяты перечной настойка

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Мяты перечной листьев настойка

**Лекарственная форма:** настойка

**Состав.**

Для получения настойки используют:

Мяты перечной листьев - 50 г

Мяты перечной листьев масла - 50 г

*Вспомогательное вещество:*

Этанол (спирт этиловый) 90 % - достаточное количество для  
получения 1000 мл

**Описание**

Прозрачная жидкость от светло-зеленого до темно-зеленого цвета с характерным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа**

Спазмолитическое средство растительного происхождения.

**Код ATX:** A03AX

**Фармакологические свойства**

Оказывает умеренное спазмолитическое действие на желудочно-кишечный тракт и легкое седативное действие.

**Показания к применению**

Применяют в качестве симптоматического средства при тошноте, рвоте, спазмах гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

**С осторожностью**

Заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

128921

**Способ применения и дозы**

Внутрь. Взрослым по 10-15 капель на прием, разведенных в  $\frac{1}{4}$  стакана воды (до исчезновения симптомов, но не более 3-4 раз в сутки). Длительность приема 1-2 недели.

*Если через 7 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

*Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

**Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Снижает эффективность гомеопатических лекарственных средств.

Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные), перед применением препарата Мяты перечной настойка проконсультируйтесь с врачом.

**Особые указания**

При сохранении симптомов заболевания или ухудшения состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу. Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата 0,25 г, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе препарата 0,9 г.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

В период применения препарата необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

**Форма выпуска**

Настойка.

По 15, 25 мл во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробкой полимерной и крышкой полимерной навинчиваемой (с контролем первого вскрытия или без), или пробкой-капельницей полимерной и крышкой полимерной навинчиваемой (с контролем первого вскрытия или без), или крышкой полимерной навинчиваемой с уплотняющим элементом (с контролем первого вскрытия или без), или колпачком алюминиевым.

По 15, 25 мл во флаконы-капельницы оранжевого стекла, укупоренные пробкой-капельницей полимерной и крышкой полимерной навинчиваемой (с контролем первого вскрытия или без), или пробкой полимерной и крышкой полимерной навинчиваемой (с контролем первого вскрытия или без), или крышкой полимерной навинчиваемой с уплотняющим элементом (с контролем первого вскрытия или без).

По 15, 25 мл во флаконы или флаконы-капельницы полимерные (полиэтилен, полиэтилентерефталат), укупоренные пробкой полимерной и крышкой полимерной навинчиваемой (с контролем первого вскрытия или без), или укупоренные пробкой-капельницей полимерной и крышкой полимерной навинчиваемой (с контролем первого

вскрытия или без), или крышкой полимерной навинчивающейся (с контролем первого вскрытия или без), или крышкой полимерной укупорочно-навинчивающейся (с контролем первого вскрытия или без), или колпачком полимерным (с контролем первого вскрытия или без).

По 0,9 кг, 2,7 кг, 4,5 кг, 9 кг, 19 кг, 20 кг, 30 кг, 45 кг в канистры из полиэтилена низкого давления (для стационаров).

На флаконы, флаконы-капельницы, канистры наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся этикетки.

На канистры наклеиваются инструкции по медицинскому применению.

Каждый флакон, флакон-капельницу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона коробочного марки А или типа хром-эрзац.

Допускается нанесение полного текста инструкции по медицинскому применению на пачку из картона.

Флаконы, флаконы-капельницы в количестве от 10 до 200 с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в пленку полиэтиленовую термоусадочную или в ящик из гофрированного картона, или в коробку из картона (для стационаров).

На термоусадочную пленку, ящик, коробку наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся этикетки.

## **Условия хранения**

В защищном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

## **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель/организация, принимающая претензии:**


ООО «БЭГРИФ», 633010, Новосибирская обл., г. Бердск,

ул. Химзаводская, д.11/19

Тел./факс (383) 212-59-73, (383-41) 2-97-53.

3

С.И. Тимофеев



[128921]