

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению лекарственного препарата

**Мальтофер® Фол**

наименование лекарственного препарата

**таблетки жевательные, 100 мг + 0,35 мг**  
лекарственная форма, дозировка

**Вифор (Интернэшнл) Инк., Швейцария**  
наименование производителя, страна

**Изменение № 4**

Дата внесения Изменения « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<b>Способ применения и дозы</b>  Для приема внутрь.  Суточную дозу препарата можно разделить на несколько приемов или принимать за один раз.  Мальтофер® Фол следует принимать во время или сразу же после приема пищи, таблетки можно разжевывать или глотать целиком.  <i>Лечение железодефицитной анемии у детей старше 12 лет и взрослых</i>  От 100 до 300 мг железа (1-3 таблетки) в сутки в течение 3-5 месяцев до нормализации содержания гемоглобина (Hb). После этого лечение следует продолжить в течение нескольких недель в дозе, описанной для случая дефицита железа без анемии, с целью восполнения запасов железа.  <i>Лечение железодефицитной анемии во время беременности</i>  От 200 мг железа и 0,70 мг фолиевой	<b>Способ применения и дозы</b>  Для приема внутрь.  Суточную дозу препарата можно разделить на несколько приемов или принимать за один раз.  Мальтофер® Фол следует принимать во время или сразу же после приема пищи, таблетки можно разжевывать или глотать целиком.  <i>Лечение железодефицитной анемии у детей старше 12 лет и взрослых</i>  От 100 до 300 мг железа (1-3 таблетки) в сутки в течение 3-5 месяцев до нормализации содержания гемоглобина (Hb). После этого лечение следует продолжить в течение нескольких недель в дозе, описанной для случая дефицита железа без анемии, с целью восполнения запасов железа.  <i>Лечение железодефицитной анемии во время беременности</i>  От 200 мг железа и 0,70 мг фолиевой

кислоты до 300 мг железа и 1,05 мг фолиевой кислоты (2-3 таблетки) в сутки до достижения нормального содержания гемоглобина (Нв). После этого лечение следует продолжить как минимум до конца беременности, принимая по 100 мг железа и 0,35 мг фолиевой кислоты (1 таблетка) в сутки, с целью восполнения запасов железа и удовлетворения возросшей в связи с беременностью потребности в железе.

*Лечение дефицита железа без анемии и профилактика дефицита железа и фолиевой кислоты*

По 100 мг железа и 0,35 мл фолиевой кислоты (1 таблетка) в сутки.

*Применение у детей*

Применение препарата Мальтофер® Фол противопоказано для детей в возрасте 12 лет и младше. В связи с необходимостью назначения малых доз в этой возрастной группе рекомендуется использовать препарат Мальтофер®, капли для приема внутрь 50 мг/мл, или Мальтофер®, сироп 10 мг/мл.

кислоты до 300 мг железа и 1,05 мг фолиевой кислоты (2-3 таблетки) в сутки до достижения нормального содержания гемоглобина (Нв). После этого лечение следует продолжить как минимум до конца беременности, принимая по 100 мг железа и 0,35 мг фолиевой кислоты (1 таблетка) в сутки, с целью восполнения запасов железа и удовлетворения возросшей в связи с беременностью потребности в железе.

*Лечение дефицита железа без анемии и профилактика дефицита железа и фолиевой кислоты*

По 100 мг железа и 0,35 мл фолиевой кислоты (1 таблетка) в сутки.

*Применение у детей*

Применение препарата Мальтофер® Фол противопоказано для детей в возрасте 12 лет и младше. В связи с необходимостью назначения малых доз в этой возрастной группе рекомендуется использовать препарат Мальтофер®, капли для приема внутрь 50 мг/мл, или Мальтофер®, сироп 10 мг/мл.

Генеральный директор  
АО «ЛегисФарм»

Некрасов О.В.

