

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Линимент бальзамический (по Вишневскому)**Регистрационный номер:****Торговое название препарата:** Линимент бальзамический (по Вишневскому)**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Деготь березовый + Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс

Лекарственная форма: линимент для наружного применения**Состав**

В 100 г линимента содержится:

Действующие вещества

Деготь березовый 3,0 г

Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс (ксероформ) 3,0 г

Вспомогательные вещества

Кремния диоксид коллоидный 5,0 г

Клещевины обыкновенной семян масло (касторовое масло) 89,0 г

Описание

Линимент от светло – желтого до зелено – коричневого цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.**Код ATX:** D08AX**Фармакологические свойства.**

Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации.

Деготь березовый обладает кератопластическим, антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению кровоснабжения тканей.

Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс (ксероформ) обладает вяжущим, адсорбирующими, противовоспалительным, антисептическим действием. При наружном применении ксероформ ускоряет регенерацию тканей.

Показания к применению

Неинфицированные, длительно незаживающие послеоперационные, посттравматические раны кожи и мягких тканей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к дегтя березовому, трибромфеноляту висмута и Висмута оксида комплексу (ксероформу) или любым вспомогательным веществам препарата; острые гнойные заболевания кожи и мягких тканей (абсцедирующий фурункул, карбункул, флегмона, абсцесс, гидраденит, лимфаденит, нагноившаяся атерома, липома, парапроктит, эмпиема плевры)

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата во время беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Препарат наносят тонким слоем на участок поражения или накладывают марлевую повязку, пропитанную линиментом.

Если после лечения улучшения не наступают или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тому, способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции. В случае необходимости, проконсультируйтесь с врачом перед применением лекарственного препарата.

Побочное действие

Аллергические реакции. При длительном применении возможно раздражение кожи.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Передозировка

Симптомы передозировки не описаны. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

Не допускать попадание линимента на слизистые оболочки и в глаза. После нанесения препарата необходимо тщательно вымыть руки для предотвращения попадания линимента в глаза, рот, нос.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Линимент бальзамический (по Вишневскому) не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Линимент для наружного применения

По 15, 20, 25 или 30 г в банки темного стекла типа БТС, укупоренные крышками полиэтиленовыми натягиваемыми, с уплотняющим элементом типа 1.2. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей или самоклеящиеся.

По 25 г и 30 г в тубы алюминиевые, покрытые лаком. Каждую банку или алюминиевую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка банок или туб без пачки от 9 до 300 штук с равным количеством инструкций по медицинскому применению в коробки картонные или ящики гофрированные (Для стационаров).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.

Производитель/организация, принимающая претензии:

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: (39543) 5-89-10, 5-89-08

Генеральный директор

АО “Усолье-Сибирский химфарм завод”

Тюстин С.В.

