

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ГЕПАТРОМБИН Г**

суппозитории ректальные 120 МЕ + 30 мг + 1,675 мг

Хемофарм А.Д. Вршац, отделение

Производственная площадка Шабац, Сербия

АО «Нижфарм», Россия

Изменение № 5

Дата внесения Изменения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Состав на 1 суппозиторий:</b></p> <p><i>действующие вещества:</i> гепарин натрия – 120 МЕ (0,667 мг при активности гепарина натрия 180 МЕ/мг), преднизолона ацетат – 1,675 мг, лауромакрогол 400 – 30,000 мг;</p> <p><i>вспомогательные вещества:</i> триглицериды среднецепочечные, кремния диоксид коллоидный, жир твердый (Novata В), глицерина тристеарат.</p>	<p><b>Состав:</b></p> <p>Один суппозиторий содержит:</p> <p><i>действующие вещества:</i> гепарин натрия – 120 МЕ (0,667 мг при активности гепарина натрия 180 МЕ/мг), преднизолона ацетат – 1,675 мг, лауромакрогол 400 – 30,000 мг;</p> <p><i>вспомогательные вещества:</i> триглицериды среднецепочечные, кремния диоксид коллоидный, жир твердый, глицерина тристеарат.</p>

По доверенности АО «Нижфарм»



А.В. Балицкая