

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

23 11 22

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Эутирокс®

(наименование лекарственного препарата)

таблетки,

25 мкг, 50 мкг, 75 мкг, 88 мкг, 100 мкг, 112 мкг, 125 мкг, 137 мкг, 150 мкг

(лекарственная форма, дозировка)

Мерк Хелскеа КГаА, Германия

(наименование производителя, страна)

Изменение № 5

Дата внесения Изменения « » 23 11 22 20 г

Старая редакция	Новая редакция
<p>Противопоказания</p> <p>– гиперчувствительность к левотироксину натрия и/или любому из вспомогательных веществ;</p> <p>– нелеченый тиреотоксикоз;</p> <p>– нелеченая гипофизарная недостаточность;</p> <p>– нелеченая недостаточность надпочечников;</p> <p>– применение в период беременности в комбинации с анти тиреоидными средствами;</p> <p>Не следует начинать лечение препаратом при наличии острого инфаркта миокарда, острого миокардита, острого панкреатита. Препарат содержит лактозу, поэтому его применение не рекомендовано пациентам с редкими наследственными заболеваниями, связанными с непереносимостью галактозы, дефицитом лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции.</p>	<p>Противопоказания</p> <p>– гиперчувствительность к левотироксину натрия и/или любому из вспомогательных веществ;</p> <p>– нелеченый тиреотоксикоз;</p> <p>– нелеченая гипофизарная недостаточность;</p> <p>– нелеченая недостаточность надпочечников;</p> <p>– применение в период беременности в комбинации с анти тиреоидными средствами;</p> <p>Не следует начинать лечение препаратом при наличии острого инфаркта миокарда, острого миокардита, острого панкреатита.</p>

Менеджер по регистрации



Логинова В.А.