

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНЗДРАВ РОССИИ

19.12.2023

СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА

Линимент бальзамический (по Вишневскому)

наименование лекарственного препарата

Линимент для наружного применения

лекарственная форма, дозировка

**АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»
665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское**

наименование юридического лица, адрес

Изменение № 1

19.12.2023

Дата внесения изменения с " ____ " _____ г.

Старая редакция	Новая редакция
1	2
Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.	Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.
Фармакологические свойства. Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации. Деготь березовый обладает кератопластическим, антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению	Фармакологические свойства. Комбинированный препарат для наружного применения. Оказывает антисептическое и местнораздражающее действие, ускоряет процессы регенерации. Деготь березовый обладает кератопластическим, антисептическим, противовоспалительным, местнораздражающим действием, способствует улучшению

<p>кровообращение тканей.</p> <p>Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс (ксероформ) обладает вяжущим, адсорбирующим, противовоспалительным, антисептическим действием. При наружном применении ксероформ ускоряет регенерацию тканей.</p>	<p>кровообращение тканей.</p> <p>Трибромфенолята висмута и Висмута оксида комплекс (ксероформ) обладает вяжущим, адсорбирующим, противовоспалительным, антисептическим действием. При наружном применении ксероформ ускоряет регенерацию тканей.</p>
<p>Применение при беременности и в период грудного вскармливания</p> <p>Применение препарата во время беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Необходимо проконсультироваться с врачом.</p>	<p>Применение при беременности и в период грудного вскармливания</p> <p>Применение препарата во время беременности возможно только в тех случаях, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Необходимо проконсультироваться с врачом.</p>

Генеральный директор

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»



С.В. Тюстин