

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**РАБЕЛОК®**

наименование лекарственного препарата

**лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 20 мг**  
**лекарственная форма, дозировка**

**Кадила Фармасьютикалз Лимитед, Индия**  
**наименование производителя, страна**

Изменение № 2

Дата внесения изменения « \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Показания к применению</b></p> <p>Рабепразол для внутривенного введения показан в качестве альтернативы для тех пациентов, для которых пероральная терапия невозможна или не показана:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- острая язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением или тяжелым эрозивным поражением;</li> <li>- острая язва желудка с кровотечением или тяжелым эрозивным поражением;</li> <li>- краткосрочная терапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с эрозивными или язвенными поражениями;</li> <li>- профилактика аспирации кислым содержимым желудка;</li> <li>- стресс-индуцированное поражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта в критических состояниях;</li> </ul>	<p><b>Показания к применению</b></p> <p>Назначают в случае наличия показаний для внутривенного введения препарата, в качестве альтернативы пероральной терапии.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Острая язва двенадцатиперстной кишки с кровотечением или тяжелым эрозивным поражением;</li> <li>- острая язва желудка с кровотечением или тяжелым эрозивным поражением;</li> <li>- краткосрочная терапия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) с эрозивными или язвенными поражениями;</li> <li>- профилактика аспирации кислым содержимым желудка;</li> <li>- стресс-индуцированное поражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта в критических состояниях;</li> </ul>

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<p>-патологические гиперсекреторные состояния, включая синдром Золлингера-Эллисона;</p> <p>-ступенчатый переход (ступенчатая терапия) с перорального приема рабепразола в случае, если пациент предварительно находился на лечении пероральным рабепразолом и временно не может принимать пероральные лекарственные средства по любой причине.</p>	<p>- патологические гиперсекреторные состояния, включая синдром Золлингера-Эллисона;</p> <p>- ступенчатый переход (ступенчатая терапия) с перорального приема рабепразола в случае, если пациент предварительно находился на лечении пероральным рабепразолом и временно не может принимать пероральные лекарственные средства по любой причине.</p>
<p><b>Способ применения и дозы</b></p> <p>Только для внутривенного введения. Внутривенное введение показано только в тех случаях, когда пероральная терапия невозможна; как только пероральная терапия может быть осуществлена, внутривенное введение прекращают.</p> <p>Рекомендуемая доза для взрослых - 20 мг один раз в сутки.</p> <p>Внутривенная инъекция: содержимое флакона растворяют в 5 мл воды для инъекций, которое вводят в течение 5-15 минут.</p> <p>Внутривенная инфузия: приготовленный, как указано выше раствор для внутривенной инъекции, в последующем должен быть разведен в достаточном количестве совместимого раствора для инфузий и введен путем краткосрочной инфузии в течение 15-30 минут.</p> <p>Совместимость с растворами для инфузии: рабепразол совместим со стерильной водой для инъекций и 0,9% раствором натрия хлорида. Никакие другие жидкости и растворы не должны применяться для внутривенного введения рабепразола.</p>	<p><b>Способ применения и дозы</b></p> <p>Только для внутривенного введения. Рекомендуемая доза для взрослых - 20 мг один раз в сутки.</p> <p>Внутривенная инъекция: содержимое флакона растворяют в 5 мл воды для инъекций, которое вводят в течение 5-15 минут.</p> <p>Внутривенная инфузия: приготовленный, как указано выше раствор для внутривенной инъекции, в последующем должен быть разведен в достаточном количестве совместимого раствора для инфузий и введен путем краткосрочной инфузии в течение 15-30 минут.</p> <p>Совместимость с растворами для инфузии: рабепразол совместим со стерильной водой для инъекций и 0,9% раствором натрия хлорида. Никакие другие жидкости и растворы не должны применяться для внутривенного введения рабепразола.</p>

Старая редакция	Новая редакция
хлорида. Никакие другие жидкости и растворы не должны применяться для внутривенного введения рабепразола.	
<b>Побочное действие</b>  Частота развития побочных эффектов классифицирована согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: очень часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); нечасто (>1/1000, <1/100); редко (>1/10000, <1/1000); очень редко (включая отдельные сообщения) (<1/10000); частота неизвестна – не может быть подсчитана по имеющимся данным.	<b>Побочное действие</b>  Частота развития побочных эффектов классифицирована согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: очень часто (>1/10); часто (>1/100, <1/10); нечасто (>1/1000, <1/100); редко (>1/10000, <1/1000); очень редко (включая отдельные сообщения) (<1/10000); частота неизвестна – не может быть подсчитана по имеющимся данным.
<b>Инфекционные и паразитарные заболевания:</b> часто – инфекции.  <b>Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:</b> редко – нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, лейкоцитоз.	<b>Инфекционные и паразитарные заболевания:</b> часто – инфекции.  <b>Нарушения со стороны крови и лимфатической системы:</b> редко – нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, лейкоцитоз.
<b>Нарушения со стороны иммунной системы:</b> редко – острые системные аллергические реакции, подострая кожная системная волчанка.	<b>Нарушения со стороны иммунной системы:</b> редко – острые системные аллергические реакции, подострая кожная системная волчанка.
<b>Нарушения со стороны обмена веществ и питания:</b> редко – анорексия; частота неизвестна – гипонатриемия, гипомагниемия.	<b>Нарушения со стороны обмена веществ и питания:</b> редко – анорексия; частота неизвестна – гипонатриемия, гипомагниемия.
<b>Психические расстройства:</b> часто – бессонница; нечасто – нервозность; редко – депрессия; частота неизвестна – спутанность сознания.	<b>Психические расстройства:</b> часто – бессонница; нечасто – нервозность; редко – депрессия; частота неизвестна – спутанность сознания.

Старая редакция	Новая редакция
<b>Нарушения со стороны нервной системы:</b> часто - головная боль, головокружение; нечасто - сонливость.	<b>Нарушения со стороны нервной системы:</b> часто - головная боль, головокружение; нечасто - сонливость.
<b>Нарушения со стороны органов зрения:</b> редко - нарушение зрения.	<b>Нарушения со стороны органов зрения:</b> редко - нарушение зрения.
<b>Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы:</b> частота неизвестна - периферический отек.	<b>Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы:</b> частота неизвестна - периферический отек.
<b>Нарушения со стороны дыхательной системы:</b> часто - кашель, фарингит, ринит; нечасто - бронхит, синусит.	<b>Нарушения со стороны дыхательной системы:</b> часто - кашель, фарингит, ринит; нечасто - бронхит, синусит.
<b>Нарушения со стороны пищеварительного тракта:</b> часто - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, запор, метеоризм; нечасто - диспепсия, сухость во рту, отрыжка; редко - гастрит, стоматит, нарушение вкусовых ощущений.	<b>Нарушения со стороны пищеварительного тракта:</b> часто - диарея, тошнота, рвота, боль в животе, запор, метеоризм; нечасто - диспепсия, сухость во рту, отрыжка; редко - гастрит, стоматит, нарушение вкусовых ощущений.
<b>Нарушения со стороны гепатобилиарной системы:</b> редко - гепатит, желтуха, печеночная энцефалопатия;	<b>Нарушения со стороны гепатобилиарной системы:</b> редко - гепатит, желтуха, печеночная энцефалопатия;
<b>Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:</b> нечасто – инфекции мочевыводящих путей; очень редко - интерстициальный нефрит;	<b>Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:</b> нечасто – инфекции мочевыводящих путей; очень редко – риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (с возможным прогрессированием до почечной недостаточности); частота неизвестна – эректильная дисфункция.
<b>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:</b> нечасто - сыпь, эритема; редко - зуд, потливость, буллезные высыпания; очень редко - мультиформная эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона.	<b>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей:</b> нечасто - сыпь, эритема; редко - зуд, потливость, буллезные высыпания; очень редко - мультиформная
<b>Нарушения со стороны костно-мышечной системы:</b> часто - неспецифическая боль,	

Старая редакция	Новая редакция
<p>боль в спине; <i>нечасто</i> - миалгия, судороги в ногах, артрит, переломы;</p> <p><b>Нарушения со стороны репродуктивной системы:</b> частота неизвестна - гинекомастия;</p> <p><b>Общие нарушения и реакции в месте введения:</b> часто - астения, гриппоподобные заболевания; <i>нечасто</i> - боль в груди, лихорадка, пирексия.</p> <p><b>Лабораторные исследования:</b> <i>нечасто</i> - повышение активности печеночных ферментов; <i>редко</i> - увеличение массы тела.</p>	<p>эритема, токсический эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-Джонсона.</p> <p><b>Нарушения со стороны костно-мышечной системы:</b> часто - неспецифическая боль, боль в спине; <i>нечасто</i> - миалгия, судороги в ногах, артрит, переломы;</p> <p><b>Нарушения со стороны репродуктивной системы:</b> частота неизвестна - гинекомастия;</p> <p><b>Общие нарушения и реакции в месте введения:</b> часто - астения, гриппоподобные заболевания; <i>нечасто</i> - боль в груди, лихорадка, пирексия.</p> <p><b>Лабораторные исследования:</b> <i>нечасто</i> - повышение активности печеночных ферментов; <i>редко</i> - увеличение массы тела.</p>

Начальник отдела регистрации  
лекарственных препаратов  
Представительства компании  
с ограниченной ответственностью  
Кадила Фармасьютикалз Лимитед (Индия), г. Москва

Е.А. Цветкова

