

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЬЯ**  
(*Eucalypti viminalis folia*)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Эвкалипта прутовидного листа.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Эвкалипта прутовидного листа.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Листья измельченные.

**СОСТАВ.**

Эвкалипта прутовидного листа.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Листья эвкалипта содержат эфирное масло, дубильные вещества, флавоноиды, органические кислоты и другие биологически активные вещества.

**ОПИСАНИЕ.**

Смесь кусочков листьев различной формы. Цвет от светло-зеленого до серовато-зеленого, иногда с фиолетовым оттенком и слабым сизоватым налетом, изредка с коричневатыми, желтоватыми и беловатыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения пряно-горький.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Антисептическое средство растительного происхождения.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Настой листьев эвкалипта оказывает противомикробное, противовоспалительное действие.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит).

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 3 лет. Для ингаляций – бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

**С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.**

Детский возраст старше 3 лет.

**ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

Около 10 г (2 столовые ложки) листьев помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Применяют местно по 1/2 - 1 стакану теплого настоя: ингаляции проводят в соответствии с рекомендациями врача 2 раза в день, полоскания 3 - 4 раза в день. Курс лечения 2-3 недели. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает, или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.**

Не описано.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

Если при приеме препарата симптомы сохраняются более одной недели, то следует обратиться к врачу. При появлении одышки, лихорадки или гнойной мокроты необходима консультация врача.

