

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Метилурацил

МИНЗДРАВ РОССИИ

ЛП-006163-020420

СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер:

Торговое наименование: Метилурацил

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Диоксометилтетрагидропиримидин.

Лекарственная форма: мазь для местного и наружного применения

Состав

В 100 г мази содержится:

Действующее вещество

Диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) 10,0 г

Вспомогательные вещества

Вазелин 45,0 г

Ланолин безводный 31,5 г

Вода очищенная 13,5 г

Описание

Однородная мазь желтоватого цвета.

Фармакотерапевтическая группа: Репарации тканей стимулятор

Код ATX: D11AX

Фармакологические свойства.

Обладает анаболической активностью. Нормализуя нуклеиновый обмен, ускоряет процессы клеточной регенерации в ранах, ускоряет рост и грануляционное созревание ткани и эпителизацию.

При наружном применении обладает фотопротекторными свойствами.

Показания к применению

В составе комплексной терапии вяло заживающие раны, ожоги, фотодерматит.

Профилактика реакций кожи при облучении новообразований с невысокой радиочувствительностью, уменьшения симптомов лучевого дерматита и поздних сращений стенок (окклюзий) влагалища – в случае лучевой терапии новообразований гениталий.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, избыточность грануляций.

С осторожностью.

Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение препарата возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. При необходимости назначения препарата в период лактации грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы

Наружно. Местно.

Мазь ежедневно наносят на пораженные участки тонким слоем в количестве 5-10 г в течение 15-30 дней. Перед нанесением рану следует обработать антисептиком и удалить остатки некротических тканей.

В случае лучевой терапии новообразований гениталий для профилактики и лечения радиоэпителиита мазь используют в рыхлых тампонах. Курс лечения индивидуален.

Особые указания.

Применение у детей до 3 лет, при беременности и в период лактации рекомендуется проводить под контролем врача.

Побочное действие

Аллергические реакции в виде зуда, гиперемии, кратковременное жжение в месте нанесения препарата.

Передозировка

Случаи передозировки при местном и наружном применении не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат совместим с наружным аппликациями антибактериальных и антисептических средств.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Препарат не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (работа диспетчера, управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Мазь для местного и наружного применения 10 %.

По 15 г, 20 г, 25 г или 30 г в банки темного стекла типа БТС укупоренные крышками полиэтиленовыми натягиваемыми с уплотняющим элементом. На банки наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся.

По 25 г и 30 г в тубы алюминиевые. Каждую банку или алюминиевую тубу вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

Допускается упаковка банок или туб без пачки от 9 до 300 штук с равным количеством инструкций по медицинскому применению помещают в коробки из картона гофрированного или картона для потребительской тары (Для стационаров).

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3,5 года. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают по рецепту.

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение.

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: (39543) 58910, 58908

Производитель/организация, принимающая претензии:

АО «Усолье-Сибирский химфармзавод»

Россия, 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, северо-западная часть города, с северо-восточной стороны, в 115 м от Прибайкальской автодороги.

тел./факс: (39543) 58910, 58908

Генеральный директор

АО “Усолье-Сибирский химфарм завод”

Тюстин С.В.

