

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**КАЛИНАКТИВ**

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации, изложенные в инструкции.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось, или улучшение не наступило через 5-7 дней.

**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** КАЛИНАКТИВ

**Международное непатентованное или группировочное наименование:**

Калины плоды

**Лекарственная форма:** сироп

**Состав**

**Для приготовления 100 г препарата необходимо:**

Калины плодов свежих	–	достаточное количество до получения 36 г сока
Сахара (сахароза)	–	64 г

**Описание**

Густая жидкость от оранжево-красного до темно-красного цвета с характерным запахом. Допускается наличие незначительного студневидного осадка, растворяющегося при нагревании до 40 °С.

**Фармакотерапевтическая группа**

Потогонное средство растительного происхождения.

**Код АТХ**

Не присвоен.

**Фармакологические свойства**

Обладает общеукрепляющим и потогонным действием, оказывает легкий диуретический эффект.

**Показания к применению**

В комплексном лечении «простудных» заболеваний, в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, панкреатит в фазе обострения, врожденная непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, дефицит сахаразы/изомальтазы.

*Если у Вас одно из перечисленных заболеваний, перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.*

*Препарат не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 3-х лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности.*

**С осторожностью**

Пациентам с сахарным диабетом и лицам, находящимся на диете с пониженным содержанием углеводов.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов.

**Способ применения и дозы**

Внутрь, после еды.

Взрослым и детям старше 12 лет – по 1 столовой ложке (15 мл) 3-5 раз в день. Детям от 6 до 12 лет – по 1 десертной ложке (10 мл) 3-5 раз в день, детям от 3 до 6 лет – по 1 чайной ложке (5 мл) 3-5 раз в день. Длительность лечения – 3-4 недели.

Повторные курсы возможны по согласованию с врачом.

*Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.*

**Побочное действие**

Возможны аллергические реакции.

*Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.*

**Передозировка**

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

**Взаимодействия с другими лекарственными средствами**

Не описано.

**Особые указания**

Необходимо учитывать, что в 1 чайной ложке сиропа содержится около 4,5 г сахарозы (0,38 XE), в 1 десертной ложке – около 9,0 г сахарозы (0,76 XE), в 1 столовой ложке – около 13,5 г сахарозы (1,14 XE).

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует сообщить об этом лечащему врачу.

#### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

#### **Форма выпуска**

Сироп.

По 135 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные пробками и крышками навинчиваемыми. По 135 г во флаконы оранжевого стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми с перфорацией с прокладками полимерными. По 135 г во флаконы из полиэтилентерефталата с колпачками системы контроля первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

#### **Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

#### **Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

#### **Производитель/Организация, принимающая претензии потребителей**

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский район, рабочий пос. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Адрес места осуществления производства: 142279, Московская обл., Серпуховский муниципальный район, городское поселение Оболенск, район рабочего поселка Оболенск, шоссе Оболенское, стр. 20.

Генеральный директор  
ООО «Экспертно-юридический центр»

Вольвак Д.А.

