

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

**ПОСТЕРИЗАН®**

**Регистрационный номер:** П N012331/01

**Торговое наименование:** Постеризан®

**Международное непатентованное или группировочное наименование:** ~

**Лекарственная форма:** мазь для ректального и наружного применения

**Состав:**

в 1,0 г мази содержится:

*Действующее вещество:* Стандартизованная суспензия культуры бактерий *E. coli* (3,30 x 10<sup>8</sup> инактивированных микробных клеток) 166,7 мг;

*Вспомогательные вещества:* фенол (сжиженный)\* 3,30\*\* мг, ланолин 166,6 мг, вазелин 666,7 мг.

\*в составе стандартизованной суспензии культуры бактерий *E. coli*

\*\*соответствует содержанию твердого фенола 3,0 мг

**Описание**

Однородная мазь от белого до бежевого цвета с характерным запахом фенола.

**Фармакотерапевтическая группа:** противогеморроидальные препараты для местного применения.

**Код АТХ:** C05AX

**Фармакологические свойства**

Антигены клеточных стенок и продукты метаболизма кишечной палочки при контакте со слизистой прямой кишки и кожей аногенитальной области повышают местную резистентность тканей к воздействию патогенной микрофлоры. Препарат стимулирует Т-лимфоцитарную систему клеточного иммунитета, увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, неспецифические факторы иммунитета, уменьшает экссудацию сосудов при воспалении, нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулирует регенерацию поврежденных тканей.

### **Показания к применению**

Постеризан мазь назначают взрослым при следующих заболеваниях:

- анальный зуд, выделения и жжение в анальной области вследствие геморроидальных заболеваний;
- анальные трещины;
- экземы.

### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Данные по применению препарата беременными и кормящими женщинами отсутствуют. В качестве меры предосторожности перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Способ применения и дозы**

Мазь наносится тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждой дефекации. Для более глубокого введения мази в прямую кишку можно использовать навинчивающийся аппликатор, прилагаемый к упаковке.

#### *Использование аппликатора*

Аппликатор навинчивается на тубу, его верхняя часть снимается. После надавливания на тубу мазь поступает в аппликатор и выступает из его боковых отверстий. После этого аппликатор аккуратно полностью вводят в анальное отверстие на всю глубину.

Смазывание аппликатора мазью способствует его введению в анальное отверстие. При повторном надавливании на тубу мазь поступает в анальный канал. Аккуратное вращение тубы приводит к равномерному распределению мази. После использования очистите аппликатор, выдавив небольшое количество мази через боковые отверстия и протерев его впитывающей салфеткой, затем наденьте обратно верхнюю часть аппликатора. Это предотвратит высыхание мази.

Если мазь не используется в течение длительного времени, аппликатор необходимо отвинтить и промыть водой.

Курс лечения составляет 2-3 недели.

### **Побочное действие**

Нежелательные реакции (НР) классифицируются в соответствии с частотой их возникновения: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто ( $\geq 1/100$ , но  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq 1/1\ 000$ , но  $< 1/100$ ), редко ( $\geq 1/10\ 000$ , но  $< 1/1\ 000$ ), очень редко ( $< 1/10\ 000$ ):

Классификация по органам и системам	Часто ( $\geq 1/100 < 1/10$ )	Нечасто ( $\geq 1/1\ 000 < 1/100$ )
Общие расстройства и нарушения в месте введения	местные реакции гиперчувствительности (например, зуд и жжение)	аллергический контактный дерматит (вследствие повышенной чувствительности к консерванту фенолу)

### **Передозировка**

О случаях передозировки не сообщалось.

При случайном проглатывании (у детей) могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы (боль в животе, тошнота).

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Не выявлены.

### **Особые указания**

Содержит ланолин: может вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

При одновременном применении мази и латексных презервативов прочность последних может нарушаться, что снижает их надежность.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами**

Постеризан<sup>®</sup> не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Мазь для ректального и наружного применения.

По 25 г мази в алюминиевую тубу (возможно наличие защитной алюминиевой мембраны для контроля первого вскрытия) с навинчивающейся полиэтиленовой крышкой. По 1 тубе вместе с аппликатором в индивидуальной упаковке и инструкцией по применению в картонную пачку.

### **Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.



Хранить в недоступном для детей месте.

**Транспортирование**

При температуре от 0 °С до 25 °С.

**Срок годности**

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке!

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ,  
Германия, 12277 Берлин, Ригиштрассе, 2  
Тел. +49 30 7208 2 0  
Факс +49 30 7208 2 200

**Организация, принимающая претензии**

ООО «Ацино Рус»  
129110, Москва, проспект Олимпийский,  
дом 16, строение 5, этаж 5, помещение I  
Телефон: +7 (495) 502-92-47  
E-Mail: [info\\_rus@acino.swiss](mailto:info_rus@acino.swiss),  
[safety\\_rus@acino.swiss](mailto:safety_rus@acino.swiss)

Медицинский директор ООО «Ацино Рус»



К. А. Соколов