

ИНСТРУКЦИЯ  
по медицинскому применению лекарственного препарата  
**ГЛИЦИН**



**Регистрационный номер:**

**Торговое наименование:** Глицин

**Международное непатентованное наименование:** глицин.

**Лекарственная форма:** таблетки подъязычные.

**Состав на одну таблетку:** глицин микрокапсулированный (в пересчете на действующее вещество глицин – 100 мг), вспомогательные вещества: метилцеллюлоза – 1 мг, магния стеарат – 1 мг.

**Описание:** круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с элементами мраморности с фаской и риской.

**Фармакотерапевтическая группа:** метаболическое средство.

**Код АТХ:** N06BX.

**Фармакологические свойства**

**Фармакодинамика:** Глицин – это аминокислота и один из основных тормозных нейромедиаторов головного мозга. Глицин нормализует и активизирует процессы защитного торможения в центральной нервной системе, уменьшает психоэмоциональное напряжение, повышает умственную работоспособность.

Глицин обладает глицин- и ГАМК-ергическим, альфа<sub>1</sub>-адреноблокирующим действием, регулирует деятельность глутаматных (NMDA) рецепторов.

Препарат обладает следующими свойствами:

- уменьшает психоэмоциональное напряжение, агрессивность, конфликтность, повышает социальную адаптацию;
- улучшает настроение;
- облегчает засыпание и нормализует сон;
- повышает умственную работоспособность;
- уменьшает вегето-сосудистые расстройства (в т.ч. в климактерическом периоде);
- уменьшает степень выраженности мозговых расстройств при ишемическом инсульте и черепно-мозговой травме;
- уменьшает токсическое действие алкоголя и других лекарственных средств, угнетающих функцию ЦНС.

**Фармакокинетика:** легко проникает в большинство биологических жидкостей и тканей организма, в т.ч. в головной мозг; метаболизируется до воды и углекислого газа; накопления в организме не происходит.

**Показания к применению:**

- сниженная умственная работоспособность;
- стрессовые ситуации – психоэмоциональное напряжение (в период экзаменов, при конфликтных и т.п. ситуациях);
- девиантные (отклоняющиеся от нормы) формы поведения детей и подростков;
- различные функциональные и органические заболевания нервной системы, сопровождающиеся повышенной возбудимостью, эмоциональной нестабильностью, снижением умственной работоспособности, памяти и нарушением сна: неврозы, неврозоподобные состояния и вегето-сосудистая дистония, стрессовые нервные расстройства, последствия нейроинфекций и черепно-мозговой травмы, перинатальные и другие формы энцефалопатий (в т.ч. алкогольного генеза);
- ишемический инсульт.

**Противопоказания:** гиперчувствительность к глицину или к другим компонентам препарата.

**Меры предосторожности при применении:** не требует специальных мер предосторожности.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:** Глицин не рекомендуется назначать в период беременности и грудного вскармливания в связи с отсутствием достаточного количества данных.

**Способ применения и дозы:** Глицин применяется подъязычно или защечно (в таблетках или в виде порошка после измельчения таблетки): взрослым, подросткам и детям старше трех лет – по 1 таблетке (100 мг), детям младше трех лет – по 0,5 таблетки (50 мг).

Глицин назначают практически здоровым детям, подросткам и взрослым при психоэмоциональном напряжении, стрессовых нервных расстройствах, снижении памяти, внимания, умственной работоспособности, задержке умственного развития, при девиантных формах поведения: 2-3 раза в день в течение 14-30 дней.

При функциональных и органических поражениях нервной системы, сопровождающихся повышенной возбудимостью, эмоциональной лабильностью и нарушением сна:

- детям младше трех лет: 2-3 раза в день в течение 7-14 дней, в дальнейшем 1 раз в день 7-10 дней, суточная доза – 100-150 мг, курсовая – 2000-2600 мг;

- детям старше трех лет, подросткам и взрослым: 2-3 раза в день в течение 7-14 дней, суточная доза – 200-300 мг, курсовая – 2800-4200 мг;

По рекомендации врача курс лечения можно увеличить до 30 дней, при необходимости курс повторяют через 30 дней.

При нарушениях сна: за 20 минут до сна или непосредственно перед сном по 0,5-1 таблетке (в зависимости от возраста).

При ишемическом мозговом инсульте: в течение первых 3-6 часов от развития инсульта назначают 1000 мг подъязычно или защечно с одной чайной ложкой воды, далее в течение 1-5 суток по 1000 мг в сутки, затем в течение последующих 30 суток 1-2 таблетки 3 раза в сутки.

В наркологии глицин применяется в качестве средства, повышающего умственную работоспособность и уменьшающего психоэмоциональное напряжение в период ремиссии при явлениях энцефалопатии, органических поражениях центральной и периферической нервной системы: по 1 таблетке 2-3 раза в день в течение 14-30 дней. При необходимости курсы повторяют 4-6 раз в год.

**Побочное действие:** аллергические реакции (очень редкие).

**Передозировка:** случаев передозировки не выявлено.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** ослабляет выраженность побочных эффектов антипсихотических средств (нейролептиков), анксиолитиков, антидепрессантов, снотворных и противосудорожных средств.

**Особые указания:** у пациентов со склонностью к артериальной гипотензии (АД) препарат применяется под контролем артериального давления и, при необходимости, проводится коррекция (уменьшение) дозы. При снижении АД ниже привычного уровня прием прекращается.

**Возможность влияния препарата на способность управления транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами:** не влияет.

**Форма выпуска:** таблетки подъязычные 100 мг. По 50 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в пачку из картона.

**Условия хранения:** при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности:** 3 года.

Не использовать позже срока, указанного на упаковке.

**Условия отпуска:** отпускают без рецепта.

**Наименование и адрес места производства лекарственного препарата / организации, принимающей претензии от потребителя:** ООО «Медицинский научно-производственный комплекс «БИОТИКИ». Россия, 115404, г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 24, стр. 1, 2, 14, 15.

Тел.: +7(495)327-86-30.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-100-32-22.

[www.biotiki.org](http://www.biotiki.org)

Директор  
ООО «МНПК «БИОТИКИ»



Я.Р. Нарциссов  
ФИО