

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

РЕОПОЛИГЛЮКИН

(торговое наименование лекарственного препарата)

раствор для инфузий, 10 %

(лекарственная форма, дозировка)

РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь

(наименование фирмы производителя, страна)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

160621


Дата внесения Изменения «___» _____ 20__ г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| Состав на 1 мл: <i>активное вещество:</i> декстран (ср.мол.масса 30000 – 40000) (в виде 10 % раствора в воде для инъекций) - 1 мл, (в пересчете на декстран (ср.мол.масса 30000-40000)) - 100 мг; <i>вспомогательное вещество:</i> натрия хлорид - 9 мг. | Состав на 1 мл: <i>действующее вещество:</i> декстран (ср.мол.масса 30000 – 40000) (в виде 10 % раствора в воде для инъекций) – 1 мл, (в пересчете на декстран (ср.мол.масса 30000-40000)) - 100 мг; <i>вспомогательное вещество:</i> натрия хлорид - 9 мг. |
| Описание: прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость. | Описание: прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый раствор. |
| Условия хранения Хранить в сухом месте при температуре от 10 до 25 °С. Предприятие гарантирует качество препарата при соблюдении температурных условий хранения и транспортирования от 10 до 25 °С, в противном случае возможно выпадение декстрана в виде белых хлопьев или пленок. Хранить в недоступном для детей месте. | Условия хранения Хранить при температуре от 10 до 25 °С. Предприятие гарантирует качество препарата при соблюдении температурных условий хранения и транспортирования от 10 до 25 °С, в противном случае возможно выпадение декстрана в виде белых хлопьев или пленок. Хранить в недоступном для детей месте. |
| Форма выпуска Раствор для инфузий 10 %. | Форма выпуска Раствор для инфузий 10 %. |

131832



| Старая редакция | Новая редакция |
|---|---|
| <p>По 200, 400 мл в бутылки стеклянные.</p> <p>Каждую бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.</p> <p>Упаковка для стационаров: 24 бутылки по 400 мл или 40 бутылок по 200 мл вместе с равным количеством инструкций по применению в ящики из гофрированного картона.</p> | <p>По 200 или 400 мл препарата в бутылки стеклянные для крови, инфузионных и трансфузионных препаратов, укупоренные пробками резиновыми и обжатые колпачками алюминиевыми или комбинированными или алюмопластиковыми или алюминиевыми с пластиковой накладкой.</p> <p>На бутылку наклеивают этикетку или этикетку самоклеящуюся.</p> <p>Каждую бутылку вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.</p> <p>Упаковка для стационаров: 24 бутылки по 400 мл или 40 бутылок по 200 мл вместе с равным количеством инструкций по применению помещают в ящик из гофрированного картона.</p> |
| <p>Условия отпуска</p> <p>По рецепту.</p> | <p>Условия отпуска</p> <p>Отпускают по рецепту.</p> |
| <p>Производитель</p> <p>РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь</p> <p><i>Юридический адрес и адрес для принятия претензий:</i></p> <p>220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, д. 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16, e-mail: medic@belmedpreparaty.com</p> | <p>Производитель/организация, принимающая претензии</p> <p>РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь,</p> <p><i>Юридический адрес и адрес для принятия претензий:</i></p> <p>220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 30, т./ф.: (+375 17) 220 37 16, e-mail: medic@belmedpreparaty.com.</p> <p><i>Адрес места производства:</i></p> <p>Республика Беларусь, 220007, г. Минск, пер. Фабрициуса, 3/10.</p> |



Заместитель генерального директора по качеству
РУП «Белмедпрепараты»



М.В. Бесполова

1131832