

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Релифипин

Гель для ректального и наружного применения, 20 мг/г + 3 мг/г


ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», Россия

Ц.П.М. КонтрактФарма ГмбХ, Германия

Изменение № 4

Дата внесения Изменения « » 31 05 22 20 г.

Старая редакция	Новая редакция
СОСТАВ:	Состав
в 1 г препарата содержится:	в 1 г препарата содержится:
Наименование Количество	Наименование Количество
компонентов	компонентов
<i><u>Действующие вещества</u></i>	<i><u>Действующие вещества</u></i>
Лидокаина 0,0213 г	Лидокаина 0,0213 г
гидрохлорид	гидрохлорид
моногидрат	моногидрат
(в пересчете на (0,0200 г)	(в пересчете на (0,0200 г)
лидокаина	лидокаина
гидрохлорид)	гидрохлорид)
Нифедипин 0,0030 г	Нифедипин 0,0030 г
<i><u>Вспомогательные вещества</u></i>	<i><u>Вспомогательные вещества</u></i>
Полоксамер 188 0,0500 г	Полоксамер 188 0,0500 г
Полоксамер 407 0,1750 г	Полоксамер 407 0,1650 г

Старая редакция	Новая редакция
Полиэтиленоксид 400 (Макрогол 400) 0,3000 г Метилпарагидрок- сibenзоат (нипагин) 0,0007 г Натрия гидроксид (натрия гидроокись) 0,0007 г Пропилпарагидрок- сibenзоат (нипазол) 0,0003 г Вода очищенная до 1 г	Полиэтиленоксид 400 (Макрогол 400) 0,3000 г Метилпарагидрок- сibenзоат 0,0007 г (нипагин) Натрия гидроксид (натрия гидро- окись) 0,00068 г Пропилпарагид- роксibenзоат (нипазол) 0,0003 г Вода очищенная до 1 г
Производитель Произведено: ОАО «Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга», 191144, г. Санкт- Петербург, ул. Моисеенко, д. 24-а, лит. Д, лит. З, Россия или Ц.П.М. КонтрактФарма ГмбХ, Фрюлингштрассе 7, 83620 Фельдкирхен-Вестерхам, Германия	Производитель Произведено: Ц.П.М. КонтрактФарма ГмбХ, Фрюлингштрассе 7, 83620 Фельдкирхен-Вестерхам, Германия 

Менеджер по регуляторной стратегии
АО «БАЙЕР»



138579

Омельчук И.А.