

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

Лайфевит

наименование лекарственного препарата

капсулы, 100 мг, 200 мг, 400 мг

лекарственная форма, дозировка

Санека Фармасьютикалс а.с., Словацкая Республика

наименование производителя, страна

Изменение № 8

Дата внесения Изменения « ___ » _____ 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>Состав</p> <p><i>Действующее вещество:</i></p> <p>Капсулы 100 мг: альфа-токоферола ацетат – 100,0 мг;</p> <p>Капсулы 200 мг: альфа-токоферола ацетат – 200,0 мг;</p> <p>Капсулы 400 мг: альфа-токоферола ацетат – 400,0 мг;</p> <p><i>вспомогательные вещества:</i> масло подсолнечное; оболочка капсулы: желатин, глицерол 85 %, метилпарагидроксибензоат, краситель пунцовый [Понсо 4R](E 124), вода очищенная.</p>	<p>Состав</p> <p><i>Действующее вещество:</i></p> <p>Капсулы 100 мг: альфа-токоферола ацетат – 100,0 мг;</p> <p>Капсулы 200 мг: альфа-токоферола ацетат – 200,0 мг;</p> <p>Капсулы 400 мг: альфа-токоферола ацетат – 400,0 мг;</p> <p><i>вспомогательные вещества:</i> масло подсолнечное; оболочка капсулы: желатин, глицерол 85 %, метилпарагидроксибензоат, краситель пунцовый [Понсо 4R] (E 124), вода очищенная, миглиол 812 (следы), лецитин соевый (следы).</p>
<p>ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ</p> <p>Повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый инфаркт миокарда, детский возраст.</p>	<p>ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ</p> <p>Повышенная чувствительность к сое, соевым бобам (в препарате могут содержаться следы соевого лецитина) и другим компонентам препарата, острый инфаркт миокарда, детский возраст.</p>

Менеджер по регистрации



Хотулева Е.В.